

## เลี้ยงสุนัขให้ถูกต้อง ได้อย่างไร

1. นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี (ปีแรกควรฉีด 2 ครั้ง)
2. ไม่ปล่อยสุนัขไปเฟ้นฟ่านในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่นำสุนัขออกนอกบ้านต้องอยู่ในสายจูง
3. ถ้าสุนัขของเราถูกสุนัขอื่นกัดต้องรีบปรึกษาสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
4. ถ้าสุนัขของเราไปกัดคนอื่นต้องรับผิดชอบในการรักษาพยาบาลและให้ข้อมูลประวัติโดยเฉพาะข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



## เมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วนต้องทำ ดังนี้

1. ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยารักษาแผลสด
2. จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้เพื่อสืบหาเจ้าของ/ สอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
3. ไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับการป้องกันรักษาที่ถูกต้อง

ฉีดวัคซีนให้สุนัขปีละหน  
เพื่อในทุกคนปลอดภัยพิษสุนัขบ้า



## โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันได้อย่างไร



ด้วยความปรารถนาดีจาก  
กองสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลตำบลคูเมือง



## เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าเรบีสไวรัส ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกระสุนปืนจะอยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตเท่านั้น เมื่อออกมานอกร่างกายจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน ถูกทำลายได้ง่ายเมื่อถูกความร้อน แสงแดดหรือในสภาพที่แห้ง

## สัตว์ที่สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

สัตว์เลือดอุ่น และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น วัว ควาย ม้า หมู ลิง ชะนี กระรอก



กระแต เสือ ค้างคาว คน ชลช แต่ในประเทศไทยสัตว์ที่พบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุด คือ สุนัข (96% ของจำนวนที่พบ เชื้อจาก การวินิจฉัย ฉัยในห้องปฏิบัติการ) รองลงมาคือ แมว (3%)

## การติดต่อของโรค

โดยการรับเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำลายสัตว์เข้าทางบาดแผลที่เกิดจากการถูกกัด ข่วน เลีย หรือบาดแผลที่มีอยู่เดิม หรือได้รับเชื้อเข้าทางเยื่อตา เยื่อปาก การปลูกถ่ายเนื้อกระจกตา อาจพบติดต่อจากการหายใจแต่น้อยมาก



## อาการของผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า

**ระยะเริ่มแรก** อาจมีอาการไม่สบาย ครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เจ็บคอคล้ายเป็นหวัด อาจมีอาการคลื่นไส้ ปวดท้อง และที่พบบ่อยคืออาการคัน เลี้ยว หรือ ชา บริเวณแผลที่ถูกกัด

**ระยะอาการทางระบบประสาท** อาจคลุ้มคลั่ง ดุร้าย กลั้วน้ำ กลั้วลม ความรู้สึกไวกว่าปรกติ หุนหุนวาย หรือมีอาการซึม เป็นอัมพาต น้ำลายไหลต้องบ้วนทิ้ง กลืนน้ำลายไม่ได้

## วิธีการสังเกตสุนัขและแมวที่เป็นโรค กลั้วน้ำ

**ระยะแรก** สัตว์จะมีนิสัยแปลกไปจากเดิม ต่อมามีอาการตื่นเต้น ตกใจง่าย กระวนกระวาย กระโดดจับลมหรือแมลง กินของแปลกๆ เช่น เศษไม้ หิน ดิน ทราช กัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า กินอาหารได้น้อยลง ม่านตาเบิกขยาย และจะไวต่อแสง และเสียง เสียงเห่าหอนผิดปกติ หลังแข็ง หางตาลี้น ห้อย เนื่องจากเริ่มเป็นอัมพาต โดยค้างจะห้อย น้ำลายไหล ชิม กลืนไม่ได้ ขากรรไกรแข็ง อ้าปากค้าง ขาสั่นเดินไม่มั่นคง อัมพาตจะลุกลามไปทั่วตัว ชัก และตายภายใน 10 วัน นับแต่เริ่มแสดงอาการ



อย่างไรก็ตามสัตว์บางตัวอาจมีอาการซึม แสดงอาการระยะตื่นเต้น หรือไม่แสดงอาการ ซุกซ่อนตัวอยู่ในที่มืดเย็น และเงียบๆ ไม่กินอาหาร เอาเท้าตะกรุยคอ คล้ายกระดุกติดคอ โดยไม่มีอาการดุร้ายให้เห็นจะกัดคนต่อเมื่อถูกรบกวน